

# Esmya (ulipristalacetat) 5 mg tabletter

## Pasientkort

Hva må du vite før du bruker Esmya?

Hva må du gjøre før, under og etter behandlingen?

Bruk denne tabellen til å få oversikt over blodprøvene dine:

Symptomer på mulige leverproblemer

Esmya kan gi bivirkninger, men ikke alle får dem. En mulig bivirkning er at de kan skade leveren din. På dette kortet får du opplysninger om blodprøver du må ta under hele behandlingen og hva du må gjøre hvis du får bivirkninger på leveren.

Du må ikke ta Esmya hvis du har leverproblemer.

Informér legen din hvis du har problemer med leveren eller er usikker på om leveren din er i orden.

### Ta regelmessige blodprøver.

Før hver behandlingskur må du ta blodprøver for å sjekke hvordan leveren din fungerer. Legen vil bestemme om Esmya egner seg for deg ved å se på resultatene fra disse testene.

Under behandlingen med Esmya vil legen ta regelmessige blodprøver for å sjekke leverfunksjonen din. Disse testene må tas hver måned, og ellers noen uker etter at en behandlingskur er ferdig (se tabellen nedenfor). Disse blodprøvene forteller legen hvordan leveren din fungerer, og legen kan ikke følge med på behandlingen din uten dem.

	DATO
1. PRØVE (før behandlingen starter)	
Behandlingen starter	
2. PRØVE (4 uker etter starten)	
3. PRØVE (8 uker etter starten)	
4. PRØVE (12 uker etter starten)	
5. PRØVE (2–4 uker etter at Esmya-behandlingen er slutt)	

Avbryt behandlingen og oppsøk lege med en gang hvis du opplever noen av de følgende symptomene:

- o utmattelse, du føler deg utslitt
- o gul hud/gule øyne
- o mørk urin
- o smerter øverst til høyre i magen
- o kløe
- o kvalme (du føler deg uvel)
- o oppkast.

Legen må undersøke leveren din umiddelbart og bestemme om du kan fortsette med behandlingen.