

Rapport om vurderte bivirkningsmeldinger av koronavaksiner

Om rapporten:

- Her oppsummeres meldinger om mistenkte bivirkninger av koronavaksiner fra helsepersonell, befolkningen og vaksineprodusenter som Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har vurdert.
- Det vil være flere mottatte meldinger under behandling og disse kommer først med i neste rapport.
- De alvorlige meldingene prioriteres først og behandles vanligvis i løpet av 2-4 dager. Derfor gir ikke rapporten til enhver tid et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige bivirkninger.
- Bivirkningstallene for de ulike koronavaksinene er ikke direkte sammenlignbare. Blant annet fordi de ikke har vært i bruk like lenge, og fordi vaksinene har vært gitt til ulikt antall personer i ulike aldersgrupper.

En stor andel av sykehjemsbeboerne som er vaksinert i første omgang er svært skrøpelige eller terminalt syke pasienter. Det er i snitt 45 personer som dør hver dag på norske sykehjem eller tilsvarende til vanlig. Når man vaccinerer en slik gruppe, så vil det skje dødsfall i nær tilknytning til selve vaksinasjonstidspunktet. De aller fleste som er vaksinert ser ut til å tåle vaksinen godt. Et fellestrekk ved dødsfallene er at de har skjedd hos eldre sykehjemsbeboere med alvorlige underliggende sykdommer og svært alvorlig skrøpelighet. For flere av dødsfallene har melder oppgitt at de ikke mistenker sammenheng med vaksinasjon og at hendelsen skyldes grunnsykdom hos pasient, men de melder for sikkerhets skyld. For en del av de mest skrøpelige pasientene kan det likevel ikke utelukkes at relativt milde vaksinebivirkninger har fått alvorlige konsekvenser hos noen av disse pasientene.

Bivirkningstall per 14.01.2021

Per 14.01.2021 er det vurdert totalt 29 bivirkningsmeldinger etter Covid-19 vaksinasjon.

Kjønnfordeling

Kjønn	Kvinne	Mann
Antall	21	8

Tabell 1: Kjønnfordeling hos pasienter som har fått bivirkninger etter koronavaksinasjon

Aldersfordeling

Aldersgruppe				
18-69	70-79	80-89	90+	Ukjent alder
4	4	14	7	0

Tabell 2: Aldersfordeling hos pasienter som har fått bivirkninger etter koronavaksinasjon


Alvorlighet

Totalt antall meldinger	Antall meldinger med dødelig utfall	Alvorlige meldinger ekskl. dødsfall	Lite alvorlige meldinger
29	13	9	7

Tabell 3: Fordeling mellom meldinger med dødsfall, alvorlige og lite alvorlige meldinger

Bivirkninger fordelt etter kategori

En bivirkningsmelding kan inneholde flere mistenkte bivirkninger eller symptomer. Figur 1 og tabell 4 viser meldte bivirkninger for Comirnaty-vaksinen gruppert etter hvilken kategori de tilhører.



Figur 1: Meldte bivirkninger fordelt etter kategori for Comirnaty (en melding kan omfatte flere bivirkninger)

Kategori	Antall meldte bivirkninger
Generelle symptomer og reaksjoner på administrasjonsstedet Eks: Smerter på injeksjonsstedet, ubehag, feber, tretthet	24
Mage-tarmsymptomer Eks: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré	11
Luftveissymptomer Eks: Pustevansker, tungpustet, hyperventilering, hoste, irritasjon i luftveiene	10
Undersøkelser Eks: Unormal puls, redusert blodtrykk	7
Nevrologiske symptomer Eks: Hodepine, svimmelhet, bevissthetstap, nummenhet, kramper	6
Psykiatriske symptomer Eks: Søvnforstyrrelser, rastløshet, tiltaksløshet, engstelse	5
Muskelskjelettsymptomer Eks: Muskelsmerter, leddsmerter, muskelstivhet	4

Karsymptomer Eks: Rødming, blekhet	3
Infeksjoner Eks: Lungebetennelse	2
Symptomer fra nyre og urinveier Eks: Urinveisinfeksjon	2
Symptomer fra immunsystemet Eks: Allergisk reaksjon	1
Hudsymptomer Eks: Utslett, kløe, rødhet	1
Stoffskifte- og ernæringsbetingede symptomer Eks: Redusert appetitt	1
Hjertesymptomer Eks: Unormal hjerterytme	1

Tabell 4: Meldte bivirkninger fordelt etter kategori for Comirnaty

De vanligste meldte bivirkningene er generelle symptomer, som nedsatt allmenntilstand feber og generell sykdomsfølelse, og reaksjoner på injeksjonsstedet. Mage-tarmsymptomer som diaré, kvalme og oppkast, og luftveissymptomer som tungpusthet og hoste er også blant de vanligst meldte bivirkningene.