



Niraparib til behandling av kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne

Kategori i MedNytt: Legemiddel

Område i MedNytt: Gynekologi og obstetrikk; Kreft

Generisk navn: Niraparib

Handelsnavn:

MT-søker: Tesaro UK (1)

Synonymer virkestoff: MK4827; MK 4827; MK-4827

Synonymer indikasjon: Svlster i eggstokkene; Eggstokksvulster; Ovarialneoplasmer; Ovariesvulster; Eggstokkrekf; Ovarialkreft; Svlster i eggleder; Neoplasmer i eggleder; Tumor er eggleder; Egglederkrekf; Bukhinnesvulster; Bukhinneneoplasmer; Bukhinnetumorer; Peritonealneoplasmer; Peritonealsvulster; Peritonealtumorer; Peritoneumneoplasmer; Peritoneumsvulster; Peritoneumtumorer

Status for bruk og godkjenning

Tidsperspektiv markedsføringsstillatelse (MT) i Norge:



Metoden omfatter et nytt virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA) og US Food and Drug Administration (FDA). Metoden er tilkjent orphan drug designation (legemiddel for en sjeldent sykdom) (1).

Forventet finansieringsordning

Sykehus	<input checked="" type="checkbox"/>	Anbefalt overført	
Blå resept	<input type="checkbox"/>		
Egenfinansiering	<input type="checkbox"/>		
Usikkert	<input type="checkbox"/>		

Beskrivelse av den nye metoden

Niraparib er indikert til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med platina-sensitiv, tilbakevennende kreft i eggstokk, eggleder og bukhinne. Niraparib utøver effekt ved å hemme enzymet poly ADP-ribose polymerase (PARP). PARP er en familie med proteiner som er involvert i mange cellefunksjoner, inkludert DNA-reparasjon. Kreftceller med defekt i DNA-reparasjonssystemet, for eksempel gjennom mutasjon i genene BRCA 1 og 2, er vist å være spesielt følsomme for legemidler som hemmer PARP (2). Niraparib er formulert i kapsler og tas peroralt.

Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag

Eggstokkrekf utgår fra cellene i eggstokkene, men betegnelsen omfatter også kreft i eggleder og primær bukhinnerekf. I Norge er eggstokkrekf den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner, med 504 nye tilfeller i 2015. Forekomsten øker med økende alder, og gjennomsnittsalder ved diagnostispunkt er 59 år (3). 85-90% av tilfellene har ukjent årsak, og omtrent 15% av tilfellene skyldes en arvelig mutasjon i genene BRCA1 og 2 som gir økt kreftrisiko (4). 5-årsoverlevelse er i dag omtrent 44%, og sykdommen forårsaker rundt 240 dødsfall i Norge per år (4).

Dagens behandling

Dagens primærbehandling av eggstokkrekf er vanligvis kirurgi med det formål å fjerne alt tumorvev og oppnå nøyaktig bestemmelse av pasientens kreftstadium. Hvis pasienten har kreft i stadium I vil de vanligvis ikke behøve behandling med cytostatika, mens pasienter i de øvrige kreftstadiene trenger etterfølgende cytostatikabehandling (3). Standardbehandling består vanligvis av en kombinasjon av carboplatin og paclitaksel, men andre legemidler som cisplatin, docetaksel, syklofosfamid, dokosubicin, etoposid og bevacizumab m.m. kan være aktuelle, avhengig av pasientens kreftstadium eller hvis andre faktorer tilsier det (4) (5).

Status for dokumentasjon

Metodevurderinger eller systematiske oversikter -norske

Vi har identifisert en norsk metodevurdering om indikasjonen, men med et annet virkestoff (se Nye metoder ID2014_039)						
Metodevurdering eller systematiske oversikter –internasjonale						
Ingen relevante systematiske oversikter eller metodevurderinger identifisert						
Metodevarslser						
Det foreligger minst ett internasjonalt metodevarsle:						
<ul style="list-style-type: none">Niraparib for high grade serous, platinum sensitive ovarian cancer – second line maintenance therapy [nettdokument]. Birmingham: Horizon Scanning Research & Intelligence Centre. National Institute of Health Research. [oppdatert august 2014]. Tilgjengelig fra: http://www.hsic.nihr.ac.uk/topics/niraparib-for-high-grade-serous-platinum-sensitive-ovarian-cancer-second-line-maintenance-therapy/Niraparib for high grade serous, platinum sensitive ovarian cancer [nettdokument]. Cologne: EuroScan. [oppdatert 03. august 2015]. Tilgjengelig fra: https://www.euroscan.org/technologies/niraparib-for-high-grade-serous-platinum-sensitive-ovarian-cancer/download/2753.pdfNiraparib [nettdokument]. [London]: Specialist Pharmacy Service, NHS. [oppdatert 30. januar 2017]. Tilgjengelig fra: https://www.sps.nhs.uk/medicines/niraparib/						
Klinisk forskning						
De antatt viktigste studiene for vurdering av metoden er vist i tabellen under:						
Populasjon (N = antall deltagere)	Intervensjon	Kontrollgruppe	Hovedutfall	Studienummer* og fase	Forventet ferdig	
Pasienter over 18 år, med krefte i eggstokk, eggleder eller bukhinne, som har mottatt minst to tidligere behandlingslinjer med platinaterapi (N = 597)	Niraparib	Placebo	Progresjonsfri overlevelse	NCT01847274 , fase III-studie	Fullført juni, 2016	
*ClinicalTrials.gov Identifier www.clinicaltrials.gov						
Hvilke aspekter kan være relevante for en metodevurdering						
Klinisk effekt	<input checked="" type="checkbox"/>					
Sikkerhet/bivirkninger	<input checked="" type="checkbox"/>					
Kostnader/ressursbruk	<input checked="" type="checkbox"/>					
Kostnadseffektivitet	<input checked="" type="checkbox"/>					
Organisatoriske konsekvenser	<input type="checkbox"/>					
Etikk	<input type="checkbox"/>					
Juridiske konsekvenser	<input type="checkbox"/>					
Annet	<input type="checkbox"/>					
Hva slags metodevurdering kan være aktuell						
Hurtig metodevurdering	<input checked="" type="checkbox"/>					
Fullstendig metodevurdering	<input type="checkbox"/>					
Hovedkilder til informasjon						
(1) Niraparib: Specialist Pharmacy Service, NHS. [oppdatert 04. januar 2017]. Tilgjengelig fra: https://www.sps.nhs.uk/medicines/niraparib/						
(2) Niraparib: Tesaro [Lest 15. mars 2017]. Tilgjengelig fra: http://www.tesarobio.com/en/pipeline/niraparib						
(3) Eggstokk- og egglederkreft: Oncolex [Lest 15. mars 2017]. Tilgjengelig fra: http://oncolex.no/GYN/Diagnoser/Adnex						
(4) Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av gynækologisk kreft. Oslo: Helsedirektoratet; 2016. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/gynekologisk-kreft/eggstokkreft-tubekreft-og-bukhinnekreft						
(5) T2.2.4.3 Ovarialcancer: Norsk legemiddelhåndbok [Publisert 08. desember 2015]. Tilgjengelig fra: http://legemiddelhandboka.no/Terapi/4216?expand=1						
(6) Niraparib for high grade serous, platinum sensitive ovarian cancer – second line maintenance therapy [nettdokument]. Birmingham: Horizon Scanning Research & Intelligence Centre. National Institute of Health Research. [oppdatert august 2014]. Tilgjengelig fra: http://www.hsic.nihr.ac.uk/topics/niraparib-for-high-grade-serous-platinum-sensitive-ovarian-cancer-second-line-maintenance-therapy/						
Se under arkfanen mer om oss for mer informasjon om prosess og prosedyre for metodevarsling.						
Første varsel	DDMMYYYY					
Siste oppdatering	DDMMYYYY					